

Borger med særlig resistent ESBL, på plejecenter, institution eller bosted

Anvendes samme med retningslinje: Hygiejniske forholdsregler hos borger med særlig resistent ESBL på plejecenter, institution eller bosted

Borger diagnosticeret med ESBL

Mikroorganismen findes i mave-tarm-kanal, ofte årsag til urinvejsinfektioner

Smitemåde

Kontaktsmitte

Direkte: Fysisk kontakt, f.eks. via afføring, urin, håndtryk, personlig pleje

Indirekte: via et mellemlid, f.eks. ikke rengjort udstyr, håndtag, lyskontakter

Dråbesmitte: Hoste, nys, opkast. Ved ESBL påvist i sekret fra luftvejene og tegn på aktiv nedre luftvejsinfektion (pneumoni og hoste)

Værnemidler

Handsker, engangsovertrækskittel med lange ærmer, evt. kirurgisk maske og visir/brille ved risiko for stænk og sprøjt. Anvendes ved alle plejeopgaver, håndtering af vasketøj, rengøring og desinfektion af inventar og ved risiko for stænk og sprøjt.

Ved ESBL påvist i sekret fra luftvejene og tegn på aktiv nedre luftvejsinfektion (pneumoni og hoste): Anvendes kirurgisk maske og visir/brille inden for 1 meter af borger.

Håndhygiejne

Ved rene og tørre hænder:

Hånddesinfektion

Ved urene opgaver: Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.

Ved fugtige hænder efter brug af

handsker: Håndvask og hånddesinfektion.

Rengøring og desinfektion

Rengøring: Mikrofiberklude (VIMA) med vand og sæbe eller for præparerede engangsklude med vand og sæbe, grøn, (WetWipe).

Desinfektion: For præparerede engangsklude ethanol (WetWipe) 70-85% Toiletfaciliteter og kontaktpunkter rengøres og desinficeres daglig og ved synlig forurening.

Bestik og service

Der anvendes almindeligt bestik, håndteres med handsker og bringes direkte i opvaskemaskinen og vaskes op med det samme.

Vasketøj

Håndteres urent. Undertøj, håndklæder og sengetøj vaskes separat ved 80-90 grader. Husk kogevaske med tom maskine og uden sæbe, inden næste borgers tøjvask.

Ophold/træning uden for bolig

Borger skal være iført rent tøj, rene inkontinent hjælpemidler og sår dækket af ren forbinding. Kørestol/rollator rengjort og desinficeret på håndtag. Borger udført håndvask og hånddesinfektion. Ved ESBL påvist i sekret fra luftvejene og tegn på aktiv nedre luftvejsinfektion (pneumoni og hoste) anvender borger kirurgisk maske under transport.

Borger bør ikke benytte buffet og anden selvbetjent madservice.

Besøgende og pårørende

Vejledes i håndvask /hånddesinfektion. Ved deltagelse i plejen anvendes værnemidler. Ved ESBL påvist i ekspektorat og tegn på aktiv nedre luftvejsinfektion (pneumoni og hoste) anvender pårørende også kirurgisk maske.

Information

Til sygehus ved indlæggelse, læge, hygiejnesygeplejerske og alarmcentral, IKKE flextrafik, om ESBL, inden for de sidste 6 måneder.

Ophævelse af supplerende infektionshygiejniske forholdsregler

Se retningslinjen "Hygiejniske forholdsregler hos borgere med ESBL på plejecenter, institution eller bosted"