

Borger med VRE, i eget hjem

Anvendes samme med retningslinje: Hygiejniske forholdsregler hos borger med VRE i eget hjem

Borger diagnosticeret med VRE

Mikroorganismen findes i mave-tarm-kanal, ofte årsag til urinvejsinfektioner

Smitemåde

Kontaktsmitte

Direkte: Fysisk kontakt, f.eks. via afføring urin, håndtryk, personlig pleje

Indirekte: via et mellemled, f.eks. ikke rengjort udstyr, håndtag, lyskontakter

Dråbesmitte: hoste nys opkast. Ved VRE påvist i sekret fra luftvejene og tegn på aktiv nedre luftvejsinfektion (pneumoni og hoste)

Værnemidler

Handsker, engangsovertræks-kittel med lange ærmer, evt. kirurgisk maske og visir/brille ved risiko for stænk og sprøjt. Anvendes ved alle plejeopgaver, håndtering af vasketøj, rengøring af inventar og ved risiko for stænk og sprøjt

Ved VRE påvist i sekret fra luftvejene og tegn på aktiv nedre luftvejsinfektion (pneumoni og hoste): anvendes kirurgisk maske og visir/brille inden for 1 meter af borger.

Håndhygiejne

Ved rene og tørre hænder:

Håndesinfektion

Ved urene opgaver: Håndvask efterfulgt af håndesinfektion

Ved fugtige hænder efter brug af

handsker: Håndvask og håndinfektion

Rengøring

Rengøring: Mikrofiberklude (VIMA) med vand og sæbe eller for præparerede engangsklude med vand og sæbe, grøn, (wetwipe)

Toiletfaciliteter og kontaktpunkter rengøres daglig og ved synlig forurening

Bestik og service

Der anvendes almindeligt bestik, håndteres med handsker og vaskes op med det samme, med almindeligt opvaskemiddel

Vasketøj

Håndteres urent. Undertøj, håndklæder og sengetøj vaskes separat ved 80-90 grader.

Ophold/træning uden for hjemmet

Borger skal være iført rent tøj, rene inkontinent hjælpemidler og sår dækket af ren forbinding. Kørestol/rollator rengjort på håndtag. Borger udført håndvask og håndesinfektion. Ved VRE påvist i sekret fra luftvejene og tegn på aktiv nedre luftvejsinfektion (pneumoni og hoste) anvender borger kirurgisk maske under transport.

Borger bør ikke benytte buffet og anden selvbetjent madservice.

Besøgende og pårørende

Vejledes i håndvask /håndesinfektion. Ved deltagelse i plejen anvendes værnemidler. Ved VRE påvist i ekspektorat og tegn på aktiv nedre luftvejsinfektion (pneumoni og hoste) anvender pårørende også kirurgisk maske.

Information

Til sygehus ved indlæggelse, læge, hygiejnesygeplejerske og alarmcentral. IKKE flextrafik, om VRE inde for de sidste 6 måneder.

Ophævelse af supplerende infektionshygiejniske forholdsregler

Se retningslinjen " Hygiejniske forholdsregler hos borgere med VRE i eget hjem