

Borger med Roskildesyge/Norovirus/Gastroenteritis infektion, i eget hjem

Anvendes samme med retningslinje: Hygiejniske forholdsregler hos borger med Roskildesyge/Norovirus/Gastroenteritis i eget hjem

Borger med Roskildesyge

Årsag Norovirus, Rotavirus, mf. Pludselig opstået symptomer med kvalme, diarré opkastninger og hovedpine. Starter 10-48 timer efter smitte forsvinder spontant efter 24-48 timer

Smitemåde

Kontaktsmitte

Direkte: Fysisk kontakt, f.eks. via opkast, afføring, håndtryk, personlig pleje

Indirekte: via et mellemed, f.eks. ikke rengjort udstyr, håndtag, lyskontakter

Dråbesmitte: ved opkastninger, host og nys, spredes dråber der kan indåndes

Værnemidler

Handsker, engangsovertræks-kittel med lange ærmer, evt. kirurgisk maske og visir/brille ved opkastninger.

Tages på og af i borgers hjem. Anvendes ved alle plejeopgaver, håndtering af vasketøj, rengøring af inventar og ved risiko for stænk og sprøjt

Håndhygiejne

Altid håndvask med efterfølgende

håndesinfektion. Virus der giver Roskildesyge (Norovirus) er meget modstandsdygtige og ikke følsomme for alkohol, derfor er håndesinfektion ikke tilstrækkelig

Rengøring og desinfektion

Rengøring: der anvendes Mikrofiberklude (VIMA) med vand og sæbe eller for præparerede engangsklude med vand og sæbe, grøn, (wetwipe)

Desinfektion: der anvendes klorklude fra WetWipe eller Actichlor Plus 1000 ppm (1tbl til 1 L vand)

Toiletfaciliteter rengøres og desinficeres daglig og ved synlig forurening. Kontaktpunkter rengøres dagligt.

Bestik og service

Der anvendes almindeligt bestik, håndteres med handsker og vaskes op med det samme, med almindeligt opvaskemiddel.

Vasketøj

Håndteres urent. Undertøj, håndklæder og sengetøj vaskes separat ved 80-90 grader.

Ophold/træning uden for hjemmet

Fællestræning, indkøb behandling/undersøgelser f.eks. læge-og tandlægebesøg udsættes hvis muligt indtil smittede borger har været symptomfri i 48 timer

Besøgende og pårørende

Vejledes i håndvask og håndesinfektion. Ved deltagelse i plejen anvendes værnemidler.

Information

Til Sygehus ved indlæggelse, læge, hygiejnesygeplejerske og alarmcentral, vedrørende smitte status.

Ophævelse af supplerende infektionshygiejniske forholdsregler

Se retningslinjen "Hygiejniske forholdsregler hos borger med Roskildesyge/Norovirus/Gastroenteritis i eget hjem